

## BRAVO 500 SC-1litru



**Preț:** Nu a fost evaluat încă?

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

### **BRAVO 500 SG**

**Substanța activă:** clorotalonil 500 g/litru

**Formulare:** SC (suspensie concentrată)

**Toxicitate:** toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

**Mod de ambalare:** flacon 1 litru

**Clasificare:** fungicid de contact pentru combaterea unui spectru larg de patogeni la culturile de legume, cartofi, sfecla, cereale,

pomi fructiferi, vita de vie.

**Spectru de combatere:** alternarioza, cercosporioza, patarea cafeie, patarea rosie a frunzelor, basicarea frunzelor, antracnoza, mana, putregaiul frunzelor, putregaiul cenusiu, fainare, rapan, boli foliare si ale spicului la cereale.

#### **Mod de actiune**

Bravo 500 SC este un fungicid de contact cu aplicare preventiva, inainte de aparitia bolii, ce asigura plantei o protejare foarte buna contra agentilor patogeni.

Intervalul dintre tratamente este de 7 - 14 zile.

#### **Modul de utilizare**

**Tomate** - in concentratie de 0.2%(1.5-2L/ha) sau 200ml la 100-130 litri de apa, combate: mana (*Phytophthora infestans*), alternarioza (*Alternaria solani*), patarea cafeie (*Cladosporium fulvum*), antracnoza (*Colletotrichum coccodes*), putregaiul cenusiu (*Botrytis cinerea*).

- in concentratie de 0.4% sau 200ml la 50 litri de apa, combate: septorioza sau patarea alba a frunzelor (*Septoria lycopersici*).  
Timp de pauza 3 zile de la ultimul tratament pina la recoltare.

**Ceapa** - doza de 1.5-2L/ha, sau 200 ml la 80 litri de apa combate mana (*Peronospora destructor*), putregaiul cenusiu (*Botrytis allii*).

Timp de pauza 14 zile de la ultimul tratament pina la recoltare.

**Cartof** - doza de 1.5-2L/ha, sau 200 ml la 60-80 litri de apa combate mana (*Phytophthora infestans*), alternarioza (*Alternaria solani*).

Timp de pauza 7 zile de la ultimul tratament pina la recoltare.

**Castraveti** - doza de 1.5-2L/ha, sau 200 ml la 80 litri de apa combate mana (*Pseudoperonospora cubensis*), alternarioza (*Alternaria cucumerina*), fainare (*Sphaerotheca fuliginea*).

Timp de pauza 3 zile de la ultimul tratament pina la recoltare.

**Pepeii galbeni** - in concentratie de 0.25% sau 200 ml la 80 litri de apa combate mana (*Pseudoperonospora cubensis*), fainarea (*Sphaerotheca fuliginea*).

Timp de pauza 3 zile de la ultimul tratament pina la recoltare.

**Mar** - in concentratie de 0.25% sau 200 ml la 80 litri de apa combate rapan (*Venturia inequalis*) - (2.5L/ha infectii secundare).

Timp de pauza 21 zile de la ultimul tratament pina la recoltare.

**Par** - in concentratie de 0.15% sau 200 ml la 100-130 litri de apa combate rapan (*Venturia pirina*).

Timp de pauza 21 zile de la ultimul tratament pina la recoltare.

**Prun** - in concentratie de 0.15% sau 200 ml la 100-130 litri de apa combate monilioza (*Monilinia laxa*), patarea rosie (*Polistigma rubrum*).

Timp de pauza 21 zile de la ultimul tratament pina la recoltare.

**Piersic** - in concentratie de 0.15% sau 200 ml la 100-130 litri de apa combate basicarea frunzelor (*Taphrina deformans*), monilioza (*Monilinia laxa*).

Timp de pauza 60 zile de la ultimul tratament pina la recoltare.

**Capsun** - in concentratie de 0.25% sau 200 ml la 80 litri de apa combate putregaiul cenusiu (*Botrytis cinerea*).

Timp de pauza 10 zile de la ultimul tratament pina la recoltare.

**Sfecla de zahar:** cercosporioza (*Cercospora beticola*) - 1,5-2L/ha sau 200ml la 100 litri de apa.

Timp de pauza 49 zile de la ultimul tratament pina la recoltare.

**Grau** - in doza de 1.5L/ha, se aplic? asociat cu alte produse, pân? la stadiul BBCH 69 pentru combaterea unui complex de boli foliare si ale spicului (*Erysiphe graminis*, *Septoria tritici*, *Fusarium spp.*, *Puccinia recondida*, *Helminthosporium tritici repens*).

**Orz de toamna** - in doza de 1.5L/ha, se aplic? asociat cu alte produse, pân? la stadiul BBCH 59 pentru combaterea unui complex de boli foliare si ale spicului (*Erysiphe graminis*, *Pyrenophora teres*, *Rhynchosporium secalis*).

#### **Fitotoxicitate**

Bravo 500 SC este bine suportat de plante la dozele recomandate si nu produce arsuri pe plante inclusiv pe organele florale.

#### **Compatibilitate**

Bravo 500 SC este un produs polivalent ce poate fi aplicat în amestec cu alte produse fitosanitare.

#### **M?surile de igien? ?i protec?ia muncii**

##### **Fraze de risc**

Iritant pentru c?ile respiratorii ?i pentru ochi. A se evita contactul cu ochii ?i cu pielea.

În caz de contact sp?lati ?i cl?ti?i bine cu ap? curat?.

În caz de intoxica?ie consulta?i urgent medicul.

##### **Fraze de siguran??**

Este interzis consumul de alimente, b?uturi ?i fumatul în timpul manipulării.

Folosi?i mânu?i ?i echipament de de protec?ie.

S.C. Doradda S.R.L.

Bul. Regele Carol I, Nr. 23  
300180 Timișoara  
România  
Timiș  
+40 256 204912  
+40 256 204912

**DORADDA** 

---

A se utiliza un ambalaj corespunzător pentru evitarea contaminării mediului.

**Mod de păstrare**

A nu se lăsa la îndemâna copiilor, bătrânilor și persoanelor neautorizate.

A se păstra departe de alimente, băuturi, furaje pt animale.

Se păstrează la loc uscat și răcoros.

**Valabilitate**

Vezi termenul de pe ambalaj !

**Preț unitar**

- Pentru livrări en-gros, solicitați listă de prețuri !

- Prețurile NU conțin TVA !