

## BRAVO 500 SC-200ml



**Preț:** Nu a fost evaluat încă?

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

### **BRAVO 500 SC**

**Substanța activă:** clorotalonil 500 g/litru

**Formulare:** SC (suspensie concentrată)

**Toxicitate:** toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

**Mod de ambalare:** flacon 200ml

**Clasificare:** fungicid de contact pentru combaterea unui spectru larg de patogeni la culturile de legume, cartofi, sfecla, cereale, pomi fructiferi, vita de vie.

**Spectru de combatere:** alternarioza, cercosporioza, patarea cafei, patarea rosie a frunzelor, basicarea frunzelor, antracnoza, mana, putregaiul frunzelor, putregaiul cenusiu, fainare, rapan, boli foliare si ale spicului la cereale.

### **Mod de actiune**

Bravo 500 SC este un fungicid de contact cu aplicare preventiva, inainte de aparitia bolii, ce asigura plantei o protejare foarte buna contra agentilor patogeni.

Intervalul dintre tratamente este de 7 - 14 zile.

### **Modul de utilizare**

**Tomate** - in concentratie de 0.2%(1.5-2L/ha) sau 200ml la 100-130 litri de apa, combate: mana (Phytophthora infestans), alternarioza (Alternaria solani), patarea cafei (Cladosporium fulvum), antracnoza (Colletotrichum coccodes), putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea).

- in concentratie de 0.4% sau 200ml la 50 litri de apa, combate: septorioza sau patarea alba a frunzelor (Septoria lycopersici).  
Timp de pauza 3 zile de la ultimul tratament pina la recoltare.

**Ceapa** - doza de 1.5-2L/ha, sau 200 ml la 80 litri de apa combate mana (Peronospora destructor), putregaiul cenusiu (Botrytis allii).

Timp de pauza 14 zile de la ultimul tratament pina la recoltare.

**Cartof** - doza de 1.5-2L/ha, sau 200 ml la 60-80 litri de apa combate mana (Phytophthora infestans), alternarioza (Alternaria solani).

Timp de pauza 7 zile de la ultimul tratament pina la recoltare.

**Castraveti** - doza de 1.5-2L/ha, sau 200 ml la 80 litri de apa combate mana (Pseudoperonospora cubensis), alternarioza (Alternaria cucumerina), fainare (Sphaerotheca fuliginea).

Timp de pauza 3 zile de la ultimul tratament pina la recoltare.

**Pepeni galbeni** - in concentratie de 0.25% sau 200 ml la 80 litri de apa combate mana (Pseudoperonospora cubensis), fainarea (Sphaerotheca fuliginea).

Timp de pauza 3 zile de la ultimul tratament pina la recoltare.

**Mar** - in concentratie de 0.25% sau 200 ml la 80 litri de apa combate rapan (Venturia inequalis) - (2.5L/ha infectii secundare).  
Timp de pauza 21 zile de la ultimul tratament pina la recoltare.

**Par** - in concentratie de 0.15% sau 200 ml la 100-130 litri de apa combate rapan (Venturia pirina).

Timp de pauza 21 zile de la ultimul tratament pina la recoltare.

**Prun** - in concentratie de 0.15% sau 200 ml la 100-130 litri de apa combate monilioza (Monilinia laxa), patarea rosie (Polistigma rubrum).

Timp de pauza 21 zile de la ultimul tratament pina la recoltare.

**Piersic** - in concentratie de 0.15% sau 200 ml la 100-130 litri de apa combate basicarea frunzelor (Taphrina deformans), monilioza (Monilinia laxa).

Timp de pauza 60 zile de la ultimul tratament pina la recoltare.

**Capsun** - in concentratie de 0.25% sau 200 ml la 80 litri de apa combate putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea).

Timp de pauza 10 zile de la ultimul tratament pina la recoltare.

**Sfecla de zahar:** cercosporioza (Cercospora beticola) - 1,5-2L/ha sau 200ml la 100 litri de apa.

Timp de pauza 49 zile de la ultimul tratament pina la recoltare.

**Grau** - in doza de 1.5L/ha, se aplic? asociat cu alte produse, pân? la stadiul BBCH 69 pentru combaterea unui complex de boli foliare si ale spicului (*Erysiphe graminis*, *Septoria tritici*, *Fusarium spp.*, *Puccinia recondida*, *Helminthosporium tritici repens*).

**Orz de toamna** - in doza de 1.5L/ha, se aplic? asociat cu alte produse, pân? la stadiul BBCH 59 pentru combaterea unui complex de boli foliare si ale spicului (*Erysiphe graminis*, *Pyrenophora teres*, *Rhynchosporium secalis*).

### **Fitotoxicitate**

Bravo 500 SC este bine suportat de plante la dozele recomandate si nu produce arsuri pe plante inclusiv pe organele florale.

### **Compatibilitate**

Bravo 500 SC este un produs polivalent ce poate fi aplicat în amestec cu alte produse fitosanitare.

### **M?suri de igien? ?i protec?ia muncii**

#### **Fraze de risc**

Iritant pentru c?ile respiratorii ?i pentru ochi. A se evita contactul cu ochii ?i cu pielea.

În caz de contact sp?lăti ?i cl?ti?i bine cu apă curat?.

În caz de intoxica?ie consulta?i urgent medicul.

#### **Fraze de siguran??**

Este interzis consumul de alimente, b?uturi ?i fumatul în timpul manipulării.

S.C. Doradda S.R.L.

Bul. Regele Carol I, Nr. 23  
300180 Timișoara  
România  
Timis  
+40 256 204912  
+40 256 204912

**DORADDA** 

---

Folosiți mânuși și echipament de protecție.

A se utiliza un ambalaj corespunzător pentru evitarea contaminării mediului.

**Mod de păstrare**

A nu se lăsa la îndemâna copiilor, bătrânilor și persoanelor neautorizate.

A se păstra departe de alimente, băuturi, furaje pt animale.

Se păstrează la loc uscat și răcoros.

**Valabilitate**

Vezi termenul de pe ambalaj !

**Preț unitar**

- Pentru livrări en-gros, solicitați listă de prețuri !

- Prețurile NU conțin TVA !