

S.C. Doradda S.R.L.

Bul. Regele Carol I, Nr. 23
300180 Timișoara
România
Timis
+40 256 204912
+40 256 204912

DORADDA 

FUNGURAN OH 50WP-30g



Preț redus la 6,50 lei **cu taxă de vânzare de 0,50 lei**

Prețul de vânzare 6,00 lei

Prețul de vânzare fără taxă 5,50 lei

Reducere

Valoarea taxei 0,50 lei

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

FUNGURAN OH 50 WP

Substanța activă: 77% hidroxid de cupru, 50% Cu metalic

Formulare: WP (pulbere umectabilă)

Toxicitate: toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

Mod de ambalare: plic 30g

Clasificare: fungicid de contact pentru combaterea bolilor la cartof, tomate, castraveti, fasole, ceapa, vita de vie, mar, par, cires, sfecla de zahar, hamei

Spectru de combatere: mană, alternarioză, petărea albă, petărea cafenie, patarea unghiulară, focul bacterian al rosaceelor, arsura comună și aureolată, rapăn

Cultura: legume, măr, păr, vișă de vie, cartof, sfecla de zahar, hamei

Mod de acțiune - fungicid de contact cu o capacitate de penetrare în plante și de protecție foarte bună.

Aceste caracteristici conferă produsului capacitatea de a combate ciupercile patogene, în special din grupa Phycomycete (care produc mană), dar și focul bacterian al rosaceelor.

Funguran OH 50 WP are acțiune preventivă foarte bună prin inhibarea germinăției sporilor și de blocare a dezvoltării miceliului în planta.

Perioada de protecție este în funcție de condițiile locale și variază de la 7 la 14 zile.

În condiții de infestare puternică, se va utiliza doza maximă omologată.

Mod de utilizare

Funguran OH 50 WP se utilizează pentru tratamente pe vegetație, efectuate preventiv la avertizare sau când sunt condiții favorabile de dezvoltare a patogenilor după cum urmează:

Tomate: 0,4%, (30g la 7,5 l apă) - împotriva manei (*Phytophthora infestans*). Tratamentele se aplică la un interval de 7 – 10 zile între stropiri.

Cantitatea de soluție este de 800 - 1000 l/ha.

Timp de pauză: 7 zile.

Sfecla de zahar: 0,4%(30g la 7,5 l apă) împotriva manei (*Peronospora schachtii*). Tratamentele se aplică la un interval de 7 – 10 zile între stropiri.

Hamei: 0,4%, 4kg/ha,(30g la 7,5 l apă) împotriva manei (*Peronosplasmopara humuli*). Tratamentele se aplică la un interval de 7 – 10 zile între stropiri.

Cantitatea de soluție este de 1.000 - 2.000 l/ha

Timp de pauză: 60 zile.

Castraveti: 0,3%, 3,0 kg /ha, (30g la 10 litri apă) - împotriva manei (*Pseudoperonospora cubensis*), patarea unghiulară (*Pseudomonas lachrymans*) - 0,4%, 0 kg /ha, (30g la 7,5 litri apă). Tratamentele se aplică la un interval de 7 – 10 zile între stropiri.

Cantitatea de soluție este de 600-1000 l/ha.

Timp de pauză: 3 zile.

Mar, gutui: – combată focul bacterian al rosaceelor (*Erwinia amylovora*) - prefloral - 0,2%(30g la 15litri apă), postfloral 0,04%(30g la 75litri apă), 0,3%(30g la 10 litri apă) împotriva rapanului (*Venturia inaequalis*.)

Par, gutui - împotriva focului bacterian al rosaceelor (*Erwinia amylovora*) - prefloral - 0,3%(30g la 10litri apă), postfloral 0,04%(30g la 75litri apă).

Se recomandă 1- 3 tratamente: 2 înainte de înflorit, unul imediat după înflorit, la un interval minim între stropiri de 7 zile și de 21 zile în perioada înfloritului. Cantitatea de soluție este de 1000-1500 l/ha.

Timp de pauză înaintea recoltării: nu se aplică.

Fasole: 0,25%(30g la 12 l apă) împotriva arsurii comune (*Xanthomonas phaseoli*), arsura aureolată (*Pseudomonas phaseolica*).

Tratamentele se aplică la un interval de 7 – 10 zile între stropiri.

Vita de vie: 0,2 – 0,3% împotriva manei (*Plasmopara viticola*). Se aplică maxim 4 tratamente, 2 înainte și 2 după înflorit, la un interval

de 7 – 14 zile între stropiri și 30 de zile între ultimul tratament înaintea înfloritului și primul după înflorit.

Cantitatea de soluție este de 800 - 1000 l/ha.

Timp de pauză: 60 zile

Cartof: 3 kg/ha (30g la 6 litri apă) împotriva manei (*Phytophthora infestans*). Se aplică în cel mult 3 tratamente, la un interval de 14 zile începând cu fenofaza înainte de încheierea randurilor. Cantitatea de soluție este de 300 - 400 l/ha.

Timp de pauză: 14 zile.

Măsuri de igienă și protecția muncii

Fraze de risc

Iritant pentru căile respiratorii și pentru ochi. A se evita contactul cu ochii și cu pielea.

În caz de contact spălați și clătiți bine cu apă curată.

În caz de intoxicație consultați urgent medicul.

Fraze de siguranță

Este interzis consumul de alimente, băuturi și fumatul în timpul manipulării.

Folosiți mănuși și echipament de protecție.

A se utiliza un ambalaj corespunzător pentru evitarea contaminării mediului.

Mod de păstrare

A nu se lăsa la îndemâna copiilor, bătrânilor și persoanelor neautorizate.

A se păstra departe de alimente, băuturi, furaje pt animale.

Se păstrează la loc uscat și răcoros.

Valabilitate

Vezi termenul de pe ambalaj !

Preț unitar

- Pentru livrări en-gros, solicitați listă de prețuri !

- Prețurile NU conțin TVA !