

## RIDOMIL GOLD 42,5 WP-30g



**Preț:** Nu a fost evaluat încă?

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

### **RIDOMIL GOLD PLUS 42.5 WP**

**Substanța activă:** 2,50% mefenoxam + 40% cupru

**Formulare:** WP (pulbere umectabilă)

**Toxicitate:** toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

**Mod de ambalare:** plic 30g

**Clasificare:** fungicid cu acțiune sistemică și de contact folosit pentru combaterea manei la cartof, tomate, castraveti, ceapa, vita de vie, hamei

**Spectru de combatere:** mană

**Cultura:** castraveți, tomate, cartofi, ceapă, vișă de vie, tutun, hamei.

**Mod de acțiune**

**Ridomil Gold Plus 42,5 WP** este un fungicid pentru combaterea manei, cu acțiune dublă: sistemică și de contact. Componenta sistemică este absorbită rapid de părțile verzi ale plantei, transportată acropetal și distribuită în plantă. Astfel, protejează planta din interior, precum și noile creșteri apărute imediat după tratament. Componenta de contact formează o barieră protectoare pe suprafața frunzei care inhibă germinarea sporilor.

**Mod de utilizare**

**Ridomil Gold Plus 42,5 WP** se utilizează pentru tratamente pe vegetație, efectuate preventiv la avertizare sau când sunt condiții favorabile de dezvoltare a patogenilor după cum urmează:

**Vita de vie:** 0,3%, (3kg/ha), sau 30g la 10 litri apă - împotriva manei (*Plasmopara viticola*). Se aplică maxim 3 tratamente, din faza de bob de mazăre până la compactare, la un interval de 7 – 14 zile între stropiri.

Cantitatea de soluție este de 800 - 1000 l/ha.

Timp de pauză: 15 zile

**Cartof:** 0,3%, (3kg/ha), sau 30g la 10 litri apă împotriva manei (*Phytophthora infestans*). Se aplică în cel mult 3 tratamente, la un interval de 14 zile începând cu fenofaza înainte de încheierea randurilor. Cantitatea de soluție este de 300 - 400 l/ha.

Timp de pauză: 20 zile.

**Tomate:** 0,3%, (3kg/ha), sau 30g la 10 litri apă împotriva manei (*Phytophthora infestans*). Se aplică maximum 3 tratamente la un interval de 7 – 10 zile între stropiri.

Cantitatea de soluție este de 800 - 1000 l/ha.

Timp de pauză: 3 zile.

**Ceapa:** 0,3%, (3kg/ha), sau 30g la 10 litri apă împotriva manei (*Peronospora destructor*). Se recomandă a fi efectuate cel mult 2 tratamente, cu un interval între stropiri de 7 – 10 zile. Cantitatea de soluție este de 600 l/ha.

Timp de pauză: 21 zile.

**Hamei:** 3kg/ha împotriva manei (*Pseudoperonospora humuli*). Se recomandă a fi efectuate cel mult 3 tratamente, cu un interval de 7– 10 zile între stropiri în partea a doua a perioadei de vegetație. Cantitatea de soluție este de 1500 -2000 l/ha.

**Tutun:** 3kg/ha împotriva manei (*Peronospora tabacina*). Se recomandă a fi efectuate cel mult 3 tratamente, cu un interval de 7– 10 zile între stropiri în partea a doua a perioadei de vegetație. Cantitatea de soluție este de 1500 -2000 l/ha.

**Măsuri de igienă și protecția muncii**

**Fraze de risc**

Iritant pentru căile respiratorii și pentru ochi. A se evita contactul cu ochii și cu pielea.

În caz de contact spălați și clătiți bine cu apă curată.

În caz de intoxicație consultați urgent medicul.

**Fraze de siguranță**

Este interzis consumul de alimente, băuturi și fumatul în timpul manipulării.

Folosiți măști și echipament de protecție.

A se utiliza un ambalaj corespunzător pentru evitarea contaminării mediului.

**Mod de păstrare**

A nu se lăsa la îndemâna copiilor, bătrânilor și persoanelor neautorizate.

A se păstra departe de alimente, băuturi, furaje pt animale.

Se păstrează la loc uscat și răcoros.

**Valabilitate**

Vezi termenul de pe ambalaj !

**Prezentare unitară**

- Pentru livrări en-gros, solicitați listă de prețuri !

- Prețurile NU conțin TVA !