

## SHAVIT F72WP - 200g



**Evaluare:** Nu a fost evaluat încă?

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

### **SHAVIT F 72 WP**

**Substanța activă:** 2% triadimenol + 70% folpet

**Formulare:** WP (pulbere umectabilă)

**Toxicitate:** toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

**Mod de ambalare:** plic 200g

**Clasificare:** fungicid cu acțiune sistemică și de contact, folosit pentru combaterea bolilor în culturile horticoale.

**Spectru de combatere:** mană, fainare, alternarioză, putregai cenușiu, răsucire

**Cultura:** castraveți, tomate, pepeni, cartofi, ceapă, măr, piersică, vișină de vie

#### **Mod de acțiune**

**Shavit F 72 WP** - este un fungicid complex conținând două substanțe active cu acțiune sistemică și de contact, împotriva celor mai importante boli care atacă culturile horticoale. Acțiunea sinergică a celor două principii active, asigură un efect rapid, preventiv și curativ de lungă durată.

Perioada de protecție este în funcție de condițiile locale și variază de la 7 la 14 zile.

În condiții de infestare puternică, se va utiliza doza maximă omologată.

#### **Mod de utilizare**

**Shavit F 72 WP** - se utilizează pentru tratamente aplicate în perioada de vegetație, efectuate preventiv la avertizare sau când sunt condiții favorabile de dezvoltare a patogenilor după cum urmează:

**Mar, par:** 0,2%, 2 kg/ha sau 20g la 10 litri apă - împotriva rapanului (*Venturia* spp.), fâinarea (*Podosphaera leucotrice*). Se recomandă 1-4 tratamente începând cu faza de dez mugurire, în alternanță cu alte produse sistemice, la un interval minim între stropiri de 7 zile și de 21 zile în perioada înfloritului. Cantitatea de soluție este de 800-1.000 l/ha.

Timp de pauză înainte de recoltare: 10-14 zile.

**Vita de vie:** 0,2%, 2kg/ha sau 20g la 10 litri apă - împotriva manei (*Plasmopara viticola*), fâinare (*Uncinura leucator*), putregaiul cenușiu (*Botrytis*). Se aplică 2-3 tratamente, unul înainte și 2 după înflorit, la un interval de 7 - 14 zile între stropiri.

Cantitatea de soluție este de 800 - 1000 l/ha.

Timp de pauză: 14 zile

**Tomate, castraveți, pepeni:** 0,2%, (2,0 kg/ha) sau 20g la 10 litri apă - împotriva manei (*Phytophthora infestans*), fâinări (*Sphaerotheca fuliginea*) și alternariozei (*Alternaria solani*). Se aplică maximum 3 tratamente la un interval de 7 - 10 zile între stropiri.

Cantitatea de soluție este de 800 - 1000 l/ha.

Timp de pauză: 7 zile.

#### **Măsuri de igienă și protecția muncii**

##### **Faze de risc**

Iritant pentru căile respiratorii și pentru ochi. A se evita contactul cu ochii și cu pielea.

S.C. Doradda S.R.L.

Bul. Regele Carol I, Nr. 23  
300180 Timișoara  
România  
Timis  
+40 256 204912  
+40 256 204912

**DORADDA** 

---

În caz de contact spălați-vă bine cu apă curată.

În caz de intoxicație consultați urgent medicul.

**Fraze de siguranță**

Este interzis consumul de alimente, băuturi și fumatul în timpul manipulării.

Folosiți măști și echipament de protecție.

A se utiliza un ambalaj corespunzător pentru evitarea contaminării mediului.

**Mod de păstrare**

A nu se lăsa la îndemâna copiilor, bătrânilor și persoanelor neautorizate.

A se păstra departe de alimente, băuturi, furaje pt animale.

Se păstrează la loc uscat și răcoros.

**Valabilitate**

Vezi termenul de pe ambalaj !

**Preț unitar**

- Pentru livrări en-gros, solicitați listă de prețuri !

- Prețurile NU conțin TVA !