

## TOPAS 100 EC-3ml



Preț redus de 6,05 lei

Prețul de vânzare 6,00 lei

Prețul de vânzare fără taxe 5,51 lei

Reducere

Valoarea taxei 0,50 lei

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

**Topas 100 EC** este cel mai utilizat fungicid sistemic la nivel mondial, pentru combaterea fâinării la un număr mare de culturi. Topas 100 EC este absorbit rapid de către toate părțile verzi ale plantei, este transportat sistemic (acropetal) și distribuit translaminar în frunze. Pe lângă acțiunea preventivă și curativă, Topas 100 EC acționează și prin vapori, protejând și zonele care nu au fost atinse de produs.

Cultura	Spectru de combatere	Doza	Epoca de aplicare	Timp de pauză*
Arbusti fructiferi	Fâinare ( <i>Sphaerotheca mors-uvae</i> ) Rugina ( <i>Cronartium ribicola</i> )	0,025% 0,05%	1-2 tratamente pe sezon, în condițiile favorabile dezvoltării bolilor	3 zile
Ardei	Fâinare	0,035%	tratamentele se pot aplica la apariția	3 zile

Castraveti (ser?)	( <i>Leveillula taurica</i> ) F?inare ( <i>Sphaerotheca fuliginea</i> )	0,025%	primelor simptome ale dezvolt?rii bolii tratamentele se pot aplica la apari?ia primelor simptome ale dezvolt?rii bolii	3 zile
Cires	P?tarea frunzelor ( <i>Blumeriella jaapi</i> ) Monilioza ( <i>Monilia spp.</i> )	0,05% (0,5 l/ha)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1-2 tratamente pe sezon înainte si dup? înflorit</li> <li>se pot efectua tratamente în perioada de maturare a fructelor</li> </ul>	
Garoafe (ser?)	Rugin? ( <i>Uromyces dianthi</i> )	0,05%	1-2 tratamente pe sezon, în condi?iile favorabile dezvolt?rii bolilor	
Hamei	F?inare ( <i>Sphaerotheca humuli</i> )	0,025%	1-2 tratamente pe sezon, în condi?iile favorabile dezvolt?rii bolilor	
M?r	F?inare ( <i>Podosphaera leucotricha</i> )	0,02% (0,2l/ha)	se poate aplica de la stadiul de început înfrunzire până la stadiul de fruct 1-2 cm	14 zile
Pepiniere, plantatii tinere de cvernicee	F?inare ( <i>Microsphaera abbreviata</i> )	0,035% (500 l solutie/ha)	1-2 tratamente pe sezon, în condi?iile favorabile dezvolt?rii bolilor	
Trandafir	F?inare ( <i>Sphaerotheca rosae</i> )	0,05% (0,5 l/ha)	1-2 tratamente pe sezon, în condi?iile favorabile dezvolt?rii bolilor	
Visin	P?tarea frunzelor ( <i>Blumeriella jaapi</i> ) Monilioza ( <i>Monilia spp.</i> )	0,05% (0,5 l/ha)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1-2 tratamente pe sezon înainte si dup? înflorit</li> <li>se pot efectua tratamente în perioada de maturare a fructelor</li> </ul>	
Vi?? de vie	F?inare ( <i>Uncinula necator</i> )	0,250 l/ha	<ul style="list-style-type: none"> <li>2-3 tratamente pe sezon, de la stadiul de l?star 15-20cm, până când boabele au m?rimea unui bob de maz?re</li> <li>intervalul dintre tratamente se adapteaz? în functie de conditiile climatice, evolutia bolii si a culturii</li> </ul>	14 zile

\* interval minim de timp de la aplicarea ultimului tratament până la recoltare

**Pre? unitar**

- Pentru livr?ri en-gros, solicita?i list? de pre?uri !
- Pre?urile NU con?in TVA !