

TOPSIN M70 - 100g



Evaluare: Nu a fost evaluat încă?

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

DORSIN M 70

Clasificare: fungicid sistemic, cu acțiune curativă și protectivă.

Substanța activă: 70% tiofanat metil.

Formulare: pulbere umectabilă.

Spectru de combatere: un spectru larg de combatere, a bolilor foliare din vegetația culturilor.

Cultura: legume, capsun, pomi fructiferi, vita de vie, cereale, silvicultură.

Mod de ambalare: 100g.

Utilizare:

CEREALE

Erysiphe graminis (**Furcărea cerealelor**) - 1 kg / ha

Boli foliare - 1 kg / ha

TOMATE

Cladosporium fulvum (**Pătarea cafeenie**) - 0,1 % (10 g / 10 l apă)

Verticillium dahliae (**Uscarea vasculară**) - 0,05 % - 0,1 % (10 g / 10 l apă)

Fusarium oxysporum (**Fusarioza**) - 0,05 - 0,1 % (10 g / 10 l apă)

ARDEI și VINETE

Verticillium dahliae (**Uscarea vasculară**) - 0,05 % - 0,1 % (10 g / 10 l apă)

CASTRAVEȚI

Fusarium oxysporum (**Fusarioză**) - 0,05 % - 0,1 % (10 g / 10 l apă)

Verticillium dahliae (**Uscarea vasculară**) - 0,05 % - 0,1 % (10 g / 10 l apă)

PEPENI GALBENI

Fusarium oxysporum (**Fusarioză**) - 0,05 - 0,1 % (10 g / 10 l apă)

MĂR

Venturia inaequalis (**Răpădă mărului**) - 0,07 % (10 g / 10 l apă)

Podosphaera leucotricha (**Furcărea mărului**) - 0,07 % (10 g / 10 l apă)

PĂR

Venturia pirina (**Răpădă părului**) - 0,07 % (10 g / 14 l apă)

Mycosphaerella sentina (**Pătarea albă a frunzelor de păr**) - 0,07 % (10 g / 14 l apă)

Diplocarpon sorauerii (Entomosporioza p?rului) - 0,07 % (10 h / 14 l ap?)

CIRE? ?i VI?IN

Monilinia spp. (Monilioza fructelor) - 0,07 % (10 g / 14 l ap?)

Coccomyces hiemalis (Antracnoza) - 0,07 % (10 g / 14 l ap?)

C?P?UNI

Mycosphaerella fragariae (P?tarea alb? a frunzelor) - 0,07 % (10 g / 14 l ap?)

Botrytis cinerea (Putregaiul cenu?iu) - 0,07 % (10 g / 14 l ap?)

VIT? DE VIE

Uncinula necator (F?inarea vi?ei de vie) - 0,1 - 0,12 % (10 g / 8 - 10 l ap? / 80 - 100 mp)

Botrytis cinerea (Putregaiul cenu?iu) - 0,1 - 0,12 % (10 g / 8 - 10 l ap? / 80 - 100 mp)

SILVICULTUR?

Dothiostroma pini (Înro?irea acelor de pin) - 0,05 - 0,1 % (10 g / 10 l ap?)

- **Timpul de pauza**, de la ultimul tratament si pana la recoltare; 3 zile la legume si pepeni, 15 zile la pomi si vita de vie, 40 zile la cereale.

Atentie!

-Pentru a proteja albinele si insectele polenizatoare, nu aplicati fungicidul in perioada de inflorire a plantelor.

-Foarte toxic pentru organismele acvatice. Poate produce mediului acvatic, daune pe termen lung.

- Inainte de folosirea produsului, cititi instructiunile de pe eticheta.

M?suri de igien? ?i protec?ia muncii

Fraze de risc

Iritant pentru c?ile respiratorii ?i pentru ochi. A se evita contactul cu ochii ?i cu pielea.

În caz de contact sp?lati ?i cl?ti?i bine cu ap? curat?.

În caz de intoxica?ie consulta?i urgent medicul.

Fraze de siguran??

Este interzis consumul de alimente, b?uturi ?i fumatul în timpul manipulării.

Folositi mânsi ?i echipament de de protec?ie.

A se utiliza un ambalaj corespunz?tor pentru evitarea contamin?rii mediului.

Mod de p?strare

A nu se l?sa la îndemâna copiilor, batrinilor si persoanelor neautorizate.

A se p?stra departe de alimente, b?uturi, furaje pt animale.

Se p?streaza la loc uscat si r?coros.

Valabilitate

Vezi termenul de pe ambalaj !

Pre? unitar

- Pentru livr?ri en-gros, solicita?i list? de pre?uri !

- Pre?urile NU con?in TVA !