



VERTIMEC 1,8 EC-250ml-acaricid



Preț: Nu a fost evaluat încă?

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

VERTIMEC 1,8 EC

Mod de ambalare: flacon 250ml

Mod de actiune:

Vertimec 1,8% EC este un acaricid-insecticid pentru combaterea dăunătorilor din culturile de legume și pomi fructiferi. Produsul combate dăunătorii rezistenți la insecticidele din grupa piretroizilor sau organofosforicelor. Vertimec 1,8% EC pătrunde rapid în frunze (efect translaminar) și formează un depozit activ ce asigură controlul dăunătorilor pe o perioadă lungă de timp. Vertimec 1,8% EC acționează în principal prin ingestie și distruge dăunătorii care se hrănesc cu părțile tratate ale plantei. Combate formele mobile ale acarienilor și puricilor meliferi (adulti și larve), dar nu are efect ovicid.

După tratamentul cu Vertimec 1,8% EC, dăunătorii paralizază imediat, însă nivelul maxim de mortalitate este obținut la 3-5 zile. Vertimec 1,8% EC este omologat în majoritatea țrilor cu tradiție în cultura legumelor și fructelor.

Cultura	Spectru de combatere	Doza	Perioada de aplicare	Timp de pauză*
Ardei solarii	Acarianul lat (<i>Polyphagotarsonemus latus</i>)	0,1% (1 l/ha p.c.,	aplicare la apariția primilor acarieni	3 zile

Castraveti	ser?	Acarianul rosu comun (<i>Tetranychus urticae</i>)	0,08%	administrat foliar) aplicare la aparitia primilor acarieni	3 zile
	solarii	Acarianul comun (<i>Tetranychus spp.</i>)	0,1% (1 l/ha p.c., administrat foliar	aplicare la aparitia primilor acarieni	
Gerbera ser?	Musca minier? (<i>Liriomyza trifolii</i>)		0,08%	aplicare la aparitia primilor adulti sau la depunerea primelor ou?	Gerbera ser?
M?r		Acarianul rosu al pomilor (<i>Panonychus ulmi</i>)	0,1% (1,5 l/ha)	aplicare în perioada de dou? s?pt?mâni dup? scuturarea petalelor pentru a se asigura un control de lung? durat?	28 de zile
		Acarianul comun (<i>Tetranychus spp.</i>)	1-1,5 l/ha (în functie de nivelul de		
		Acarianul filicoptid al m?rului (<i>Aculus schlechtendali</i>)	infestare)		
		Molia minier? circular? (<i>Leucoptera scitella</i>) Minierul marmorat (<i>Phyllonorichter blancardella</i>)			
P?r	Puricele melifer al p?rului (<i>Psylla piri</i>)		0,1-0,15% (1-1,5 l/ha)	aplicare la 7-10 zile dup? scuturarea petalelor, pentru combaterea primei generatii de purici meliferi si/sau la începutul cresterii fructelor pentru combaterea generatiei a doua	28 de zile
Prun	Acarianul rosu al pomilor (<i>Panonychus ulmi</i>) Acarianul comun (<i>Tetranychus spp.</i>) Acarianul filicoptid al puietilor de prun (<i>Aculus fockeni</i>)		0,1-0,15% (1-1,5 l/ha) în functie de nivelul de infestare	aplicare în perioada de dou? s?pt?mâni dup? scuturarea petalelor, pentru a se asigura un control de lung? durat?	28 de zile
Tomate ser?	Musca minier? (<i>Liriomyza trifolii</i>)		0,08%	aplicare la aparitia primilor adulti sau la depunerea primelor ou?	3 zile
Vinete solarii	Acarianul lat (<i>Polyphagotarsonemus latus</i>) Acarianul rosu comun (<i>Tetranychus urticae</i>)		0,1% (1 l/ha p.c., administrat foliar)	aplicare la aparitia primilor acarieni	3 zile
Vit? de vie	Acarianul vitei de vie (<i>Tetranychus urticae</i>) P?ianjenul galicol al vitei de vie (<i>Eriophyes vitis</i>)		0,8-1 l/ha în 1000 l ap? (dozele se folosesc diferentiat în functie de presiunea de infestare)	aplicare la aparitia primilor acarieni, în functie de presiunea de infestare	14 zile

Timp de pauza - interval minim de timp de la aplicarea ultimului tratament până la recoltare

M?suri de igien? ?i protec?ia muncii

A nu se folosi ca aliment sau furaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și bătrânilor.

Se păstrează în ambalajul original, bine închis, la loc uscat și răcoros, departe de alimente, băuturi și furaje pt animale.

A se evita contactul cu pielea și cu ochii.

În caz cotrar, locul se spal? foarte bine cu ap? curat?.

Dac? s-a produs intoxicarea, anun?a?i de urgen?? medicul ?i urma?i tratamentul prescris de medic.

Pentru daunele care apar din cauza folosirii și depozitarii necorespunzatoare , producatorul nu isi asuma nici o responsabilitate.

In conformitate cu legislatia EU:

- este interzisa aruncarea ambalajului gol in ape curgatoare sau in orice surse de apa.

- este interzisa depozitarea sau utilizarea la o distanta mai mica de 50 m de la malul apelor.

Valabilitate: vezi data de pe ambalaj.

Pre? unitar

Pentru livr?ri en-gros, solicita?i list? de pre?uri !

Pre?urile NU con?in TVA !