

## Zeama Bordeleza 50g



Preț care e inclus în preț de vânzare

Prețul de vânzare 7,00 lei

Prețul de vânzare fără taxe 6,42 lei

Reducere

Valoarea taxei 0,58 lei

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

## **ZEAMA BORDELEZĂ tip MIF**

**Fungicid de contact** - conține 20% cupru metalic sub forma de sulfat de cupru neutralizat. Este un amestec de var și sulfat de cupru sub forma de pulbere umectabila.

**Toxicitate:** toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

**Greutate netă: 50g**

**Descriere:** Zeama bordeleză este un fungicid cupric de mare eficacitate, care combate un spectru larg de boli în legumicultură, pomicultură, viticultură. Este compatibil cu majoritatea insecto-fungicidelor și are o eficacitate îndelungată. Se recomandă ca după fiecare ploaie, să se facă stropiri.

**Spectrul bolilor combătute:**

**1. VIȘA DE VIE - concentrația recomandată este de 0,5%**

Plasmopara viticola - mană

**2. POMI FRUCTIFERI - concentrația recomandată este de 0,5%**

Polystigma rubrum - petărea roșie a frunzelor la prun

Stigmia carpophyla - ciurirea frunzelor la prun, cais, persic, cireș, vișin

Monilinia spp - monilioza fructelor

Taphrina deformans - băcărea frunzelor la piersic, nectarin

Blumeriella jaapii - petărea frunzelor la cireș și vișin

Venturia inaequalis - rapăn la măr - tratamentul se face prefloral

Venturia pirina - rapăn la păr

**3. TOMATE - concentrația recomandată este de 0,75%**

Phytophthora infestans - mană

Alternaria solani - alternarioză

Xanthomonas vesicatoria - petărea frunzelor

Pseudomonas tomato - petărea pustulară

**4. CASTRAVEȘI - concentrația recomandată este de 0,75%**

Pseudomonas lacrymans - petărea unghiulară

Pseudoperonospora cubensis - mană

**5. FASOLE - concentrația recomandată este de 0,75%**

Xanthomonas phaseoli - arsura comună

Pseudomonas phaseolicola - arsura aureolată

**5. CEAPĂ - concentrația recomandată este de 0,75%**

Peronospora destructor - mană

### **Utilizare:**

Conținutul unui plic se dizolvă în:

- 10 l de apă pentru tratamente în viticultură,

- 7-8 l de apă pentru tratamente în legumicultură,

- 5-10 l de apă pentru tratamente în pomicultură.

Se recomandă ca după 8-10 zile să se repete tratamentul.

**Timp de pauză:** După aplicarea ultimului tratament și până la recoltare trebuie să treacă 21 zile.

### **ATENȚIE!**

Este foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

A nu se inspira praful.

NU mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării produsului.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor, bătrânilor și persoanelor neautorizate.

Este iritant pentru ochi. În caz de contact cu ochii, spălați bine cu apă curată și adresați-vă medicului.

Se păstrează la loc uscat și răcoros.

Punga deschisă se ține departe de alimente, băuturi și furaje pentru animale.

Acest produs și ambalajul său se vor depozita ca un deșeu periculos.

A nu se arunca ambalajul sau resturile nefolosite de produs oriunde în mediul înconjurător.

**Valabilitate:** vezi ambalaj.

### **Preș unitar**

- Pentru livrări en-gros, solicitați listă de prețuri !

- Prețurile NU conțin TVA !